



Ter vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcëmie
To reduce the risk of milk fever and subclinical hypocalcaemia
Zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalzämie
Réduction du risque de fièvre vitulaire et d'hypocalcémie subclinique

Met fosfor en vitamine D3 | with phosphorus and vitamin D3

Calcium



12 x 95 g



NL

Mineraal dietvoeder voor melk-
koeien in vorm van een bolus voor
orale toediening, ter vermindering
van het risico op melkziekte en
subklinische hypocalcëmie.

Toepassing

De Topro Calcium bolus is een
snel oplosbaar calciumsupplement
dat toegediend wordt aan melk-
koeien vanaf de eerste tekenen
van kalven tot twee dagen na
het kalven.

Samenstelling

Dicalciumfosfaat, magnesium-
oxide, calciumstearaat, sorbitol.

Analytische bestanddelen

Calcium	26,8%
Magnesium	1,0%
Natrium	<0,1%
Fosfor	7,5%

Toevoegingsmiddelen

Nutritionele toevoegingsmiddelen
3a671 Vitamine D3 200.000 IU/kg
Technologische toevoegings-
middelen
E238 Calciumformiaat

Dosering

Minimale dosering

• 2 bolussen 12 tot 24 uur voor
het kalven of onmiddellijk na
het kalven.

Extra dosering

• 1 of 2 bolussen 10 tot 12 uur na
het kalven.

• 1 of 2 bolussen 24 uur na het
kalven.

• 1 of 2 bolussen bij tekens van een
calciumtekort.

Na een calciuminfuus

• 2 bolussen 2-12 uur na infuus.
• 1 of 2 bolussen bij tekens van een
calciumtekort.

Gebruiksaanwijzing

• Toedienen met een geschikte
bolusschietert (folie verwijderen).
Niet toedienen aan een liggend
dier.

• Aanbevolen wordt om voor het
gebruik het advies van een dier-
voederdeskundige in te winnen.

Bewaaraadvis

Koel, droog en buiten het bereik
van kinderen bewaren.
Beschermen tegen vorst.

Elke bolus bevat 25,5 g calcium.

Tenminste houdbaar tot

Zie verpakking.

Batchnr.

Zie verpakking.

FR

Aliment minéral diététique pour
vaches laitières en forme de bolus
pour administration orale, Réducti-
on du risque de fièvre vitulaire et
d'hypocalcémie subclinique.

Application

Le bolus de Calcium Topro est
un supplément de calcium
rapidement disponible appliqué
aux vaches à partir des premiers
signes de vèlage jusqu' à 2 jours
après vèlage.

Composition

Phosphate dicalcique, oxide de
magnésium, stéarate de calcium,
sorbitol.

Constituants analytiques

Calcium	26,8%
Magnésium	1,0%
Sodium	<0,1%
Phosphore	7,5%

Additifs

Additifs nutritionnelles
3a671 Vitamine D3 200.000 IU/kg
Additifs technologiques
E238 Formiate de calcium

Dosage

Dosage minimal

• 2 bolus 12 à 24 heures avant le
vèlage ou immédiatement après
le vèlage.

Dose supplémentaire

• 1 ou 2 bolus 10 à 12 heures après
le vèlage.

• 1 ou 2 bolus 24 heures après le
vèlage.

• 1 ou 2 bolus en cas de signes de
carence en calcium.

Après une infusion de calcium

• 2 bolus 2 à 12 heures après la
perfusion.
• 1 ou 2 bolus en cas de signes de
carence en calcium.

Mode d'emploi

• Appliquer avec un lance-bolus
adapté (retirer le film). Ne pas
administrer à un animal couché.
• Avant son usage il est recom-
mandé de demander l'avis d'un
expert en nutrition animale.

Conditions de stockage

Conserver frais et sec, hors de
portée d'enfants. Protéger contre
le gel.

Chaque bolus contient 25,5 g de
calcium.

Date limitée de conservation

Voir emballage.

No de lot

Voir emballage.

EN

Dietetic mineral feed for dairy
cows in the form of a bolus for
oral administration, to reduce the
risk of milk fever and subclinical
hypocalcaemia.

Application

The Topro Calcium bolus is a rapid-
ly dissolving calcium supplement
administered to dairy cows from
the first signs of calving to two
days after calving.

Composition

Dicalcium phosphate, magnesium
oxide, calcium stearate, sorbitol.

Analytical constituents and amounts

Calcium	26.8%
Magnesium	1.0%
Sodium	<0.1%
Phosphorus	7.5%

Additives

Nutritional additives
3a671 Vitamin D3 200,000 IU/kg
Technological additives
E238 Calcium formate

Dosage

Minimum dosage

• 2 boluses 12 to 24 hours before
calving or immediately after
calving.

Additional dosage

• 1 or 2 boluses 10 to 12 hours
after calving.

• 1 or 2 boluses 24 hours after
calving.

• 1 or 2 boluses in case of signs of
a calcium deficiency.

After a calcium infusion

• 2 boluses 2-12 hours after
infusion.
• 1 or 2 boluses in case of signs of
a calcium deficiency.

Instructions for use

• Administer with a suitable bolus
applicator (remove foil). Do not
administer to a lying animal.
• Before use, we recommend taking
advice from a veterinarian or
nutritionist.

Storage instructions

Keep product cool, dry and out of
reach of children. Protect against
frost.

Each bolus contains 25.5 g
calcium.

Best before

See packaging.

Batch No.

See packaging.

DE

Diätetisches Mineralfuttermittel für
Milchkühe in Form eines Bolus zur
oralen Verabreichung, zur Verrin-
gerung des Risikos von Milchfieber
und subklinischer Hypokalzämie.

Anwendung

Die Topro Calcium Bolus ist ein
schnell löslicher Calciumzusatz, der
an Milchkühe zur Verbesserung der
Calciumversorgung ab den
ersten Anzeichen vor dem Kalben
bis zu zwei Tage nach dem Kalben
verfüttert wird.

Zusammensetzung

Dicalciumphosphat, Magnesium-
oxid, Calciumstearat, Sorbitol.

Analytische Bestandteile

Kalzium	26,8%
Magnesium	1,0%
Natrium	<0,1%
Phosphor	7,5%

Zusatzstoffe

Ernährungsphysiologische
Zusatzstoffe
3a671 Vitamin D3 200.000 IU/kg
Technologische Zusatzstoffe
E238 Calciumformiat

Fütterung

Minimale Dosierung

• 2 Bolü 12 bis 24 Stunden vor dem
Abkalben oder unmittelbar nach
dem Abkalben.

Zusätzliche Dosierung

• 1 oder 2 Bolü 10 bis 12 Stunden
nach dem Kalben.

• 1 oder 2 Bolü 24 Stunden nach
dem Kalben.

• 1 oder 2 Bolü bei Anzeichen eines
Kalziummangels.

Nach einer Kalziuminfusion

• 1 oder 2 Bolü bei Anzeichen eines
Kalziummangels.

• 1 oder 2 Bolü nach Bedarf jeder-
zeit in der Stillzeit.

Gebrauchsanweisung

• Verfütterung mit einem geeig-
neten Bolus-Applikator (Folie
entfernen). Nicht an ein liegendes
Tier verabreichen.
• Es wird empfohlen vor der ersten
Anwendung den Rat eines Futter-
mittelexperten einzuholen.

Lagerungshinweise

Kühl, trocken und außer
Reichweite von Kindern lagern.
Vor Frost schützen.

Jeder Bolus enthält 25,5 g
Kalzium.

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Batch-Nr.

Siehe Verpackung.



12 x 95 g

Calcium

Met fosfor en vitamine D3
with phosphorus and vitamin D3



Topro: registered trademark of

Farmula^v
farming forward

Farmula B.V.
Sluiskolk 3-5
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FSA geborgd
GMP+ FSA assured
GMP+ FSA gesichert


Garanti GMP+ FSA
GMO controlled
PDV103322



1



2



3