

Bovicalc(R) - Gebruiksaanwijzing

Samenstelling (per bolus)

- Calcium: 22,2%
- Water: 32,0%
- Bevat geen: natrium, fosfor of magnesium
- Calciumgehalte: 43 g per bolus

Aanbevolen gebruik

Gebruik vanaf de eerste tekenen van kalven tot twee dagen na het kalven.

Dosering

- Normale dosering:
 - 1e bolus: bij de eerste tekenen van naderende kalving
 - 2e bolus: direct na het kalven
 - 3e bolus: 12-24 uur na het kalven
 - 4e bolus: 24-48 uur na het kalven
- Minimale dosering:
 - 1e bolus: direct na het kalven
 - 2e bolus: 12-15 uur na het kalven
- Als supplement bij calciuminfusie:
 - 2 bolussen
 - 12-15 uur na bolus 1

Toediening uitsluitend oraal met een daarvoor bestemde applicator.

Voorzorgsmaatregelen

- Alleen toedienen met een aangepaste applicator.
- Niet toedienen aan dieren die niet kunnen slikken of bij verlamningsverschijnselen.
- Let op dat de bolus in gepaste staat (beschermlaag intact) wordt toegediend.

Bewaring

- Bewaren onder 30°C, in de originele verpakking.
- Beschermen tegen vocht en lucht.
- Houdbaarheid: zie verpakking (EXP-datum).

Registratie

- Geregistreerd handelsmerk van Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.
- Gebruik uitsluitend volgens instructies van een dierenarts.