



330 g / 300 ml

CarboGel

Aanvullend diervoeder - Complementary feed -
Ergänzungsfuttermittel - Aliment complémentaire

NL

Ter ondersteuning bij het dikker maken van de mest.

Samenstelling Water (63%), natuurlijk houtskool van eikenhout (32%), kaliumchloride en natriumchloride (1%). **Toevoegingsmiddelen**

Aromatische en eetlustopwekkende stoffen (0,04%). **Analytische bestanddelen** Ruwe celstof (20,8%), ruwe as (2,6%), ruw eiwit (0%), ruw vet (0%), lysine (0%), methionine (0%), natrium (0,9%).

Gebruiksaanwijzing en dosering 's Ochtends en 's avonds toedienen voor 2 à 3 dagen. 1) Plaats de tube in het speciale handpistool, 2) De kop van het dier vastpakken en iets omhoog houden, 3) De opening van de tube achter in de bek, op het midden van de tong plaatsen. Toedienen met een geschikte applicator. (1x knijpen = 15ml). Kalveren: 2 x knijpen; Schapen/Geiten: 2 x knijpen; Lammeren: 0,5 x knijpen; Gespeende biggen: 0,5 x knijpen; Biggen ± 25 kg: 1 x knijpen. Niet toedienen aan zieke of verzwakke dieren. Stop met het toedienen

van het product in het geval van verslikken. **Bewaaradvies** Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst. **Ten minste houdbaar tot / Batchnr.** zie verpakking. GMP+FSA geborgd - GMO controlled - PDV103322 - **Erkenningsnummer producent** αFR16089043

EN

To support the thickening of the manure.

Composition Water (63%), oak charcoal (32%), potassium chloride and sodium chloride (1%). **Additives** Mixture of flavouring compounds (0,04%). **Analytical constituents** Crude fiber (20.8%), crude ash (2.6%), crude protein (0%), crude fats (0%), lysine (0%), methionine (0%), sodium (0.9%). **Instructions for use and dosage** Administer in the morning and evening for 2 or 3 days. 1) Slightly lift the animal's head, 2) Enter the cartridge into the mouth to the center of the tongue, 3) Pump. Administer with a suitable applicator.

(1 stroke: 15 ml). Calves: 2 strokes; Sheep/Goats: 2 strokes; Lambs 0,5 stroke; Weaners: 0.5 stroke; Pigs ± 25 kg: 1 stroke. Do not feed to sick immobile animals. Interrupt feeding if the animal shows a false swallowing reflex. **Storage instructions** Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost. **Best before / Batch No.** see packaging. GMP+ FSA assured - GMO controlled - PDV103322 - **Approval number producer** αFR16089043

DE

Zur Unterstützung der Verdickung des Mistes. **Zusammensetzung** Wasser (63%), Eichenholzkohle (32%), Kaliumchlorid und Natriumchlorid (1%). **Zusatzstoffe** Mischung von Aromastoffen (0,04%). **Analytische Bestandteile** Rohfaser (20,8%), Rohasche (2,6%), Rohprotein (0%), Rohfett (0%), Lysin (0%), Methionin (0%), Natrium (0,9%). **Gebrauchsanweisung und Fütterung** Morgens und abends 2 bis 3 Tage lang verabreichen. 1) Kopf des Tieres

anheben, 2) Kartuschenöffnung in den Mund stecken, bis zur Zungenmitte, 3) Pumpen. Verfütterung mit einem geeigneten Applikator. (1 Pumpenstoss = 15ml). Kälber: 2 Stöße; Schafe/Ziegen: 2 Stöße; Lämmer: 0,5 Stoss; Absetzferkel: 0,5 Stoss; Ferkel ± 25 kg: 1 Stoss. Nicht an kranken immobilen Tieren verabreichen. Anwendung abbrechen, wenn sich das Tier verschluckt. **Lagerungshinweise** Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen. **Mindestens haltbar bis / Batch-Nr.** siehe Verpackung. GMP+ FSA gesichert - GMO controlled - PDV103322 - **Zulassungs-Nr. Hersteller** αFR16089043

FR

Pour favoriser l'épaississement du fumier. **Composition** Eau (63%), charbon naturel de chêne (32%), chlorure de potassium et chlorure de sodium (1%). **Additifs** Mélange des substances aromatiques (0,04%).

Constituants analytiques Cellulose brute (20,8%), cendres brutes (2,6%), protéine brutes (0%), matières grasses brutes (0%), lysine (0%), méthionine (0%), sodium (0,9 %). **Mode d'emploi et dosage** Administrer le matin et le soir pendant 2 ou 3 jours. 1) Prendre et étendre délicatement la tête de l'animal, 2) Mettre l'ouverture de la cartouche dans la bouche au centre de la langue, 3) Presser. Appliquer avec une lance adaptée. (1 pression = 15 mL). **Veaux:** 2 pressions; **Ovins/Caprins:** 2 pressions; **Agneaux:** 0,5 pression; **Porcs sevrages:** 0,5 pression; **Porcs ± 25 kg:** 1 pression. Ne pas administrer aux animaux léthargiques. Arrêter l'administration du produit en cas de fausse déglutition. **Conditions de stockage** Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel. **Date limitée de conservation / No de lot voir emballage.** Garanti GMP+ FSA - GMO controlled - PDV103322 - **No agrément du producteur** αFR16089043



Topro: registered trademark of

Farmula 
farming forward

Farmula B.V.

Sluiskolk 3-5
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl

