

#### Samenstelling

Mager melkpoeder, geraffineerde plantaardige olie (palm/kokos), weipoeder, bijproducten van zuivelindustrie, voorverstijfde tarwebloem, dextrose, ontsuikerde weipoeder, tarwebloem, calciumcarbonaat, magnesiumsulfaat monohydraat, natriumzouten van boterzuur, inuline (cichorei), colostrumpoeder.

#### Analytische bestanddelen

Ruw eiwit 23,0%, ruw vet 23,0%, ruwe as 7,1%, ruwe celstof 0,0%, fosfor 0,68%, calcium 1,1%, natrium 0,40%, lysine 1,70%.

#### Toevoegingsmiddelen per kg

##### Vitaminen

3a672a Vitamine A 25.000 I.E., 3a671 Vitamine D3 2.000 I.E., 3a700i Vitamine E 200 mg, 3a700ii Vitamine E 100 mg.

##### Sporenelementen

3b103 IJzer (ijzer(II)sulfaat-monohydraat) 30 mg, 3b503 Mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) 45 mg, 3b605 Zink (zinksulfaat-monohydraat) 84 mg, 3b201 Jodium (kaliumjodide) 2 mg, 3b811 Selenium (seleniummethionine, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) 0,2 mg, 3b801 Selenium (natriumseleniet) 0,1 mg.

##### Antioxidanten

E310 Propylgallaat 4 mg, 1b320 Butylhydroxyanisool (BHA) 4 mg.

##### Conserveermiddel

E202 Kaliumsorbaat 9 g.

#### Gebruiksaanwijzing en dosering

Schape lammeren: 1:5 (voor 1 liter melk 165 gram poeder op 835 gram water)

Geiten lammeren: 1:6 (voor 1 liter melk 145 gram poeder op 855 gram water)



1,75 kg

# Lammeren- melk

Volledig melkvervanger voor  
het opfokken van schape- en  
geitenlammeren

Los het poeder op in de helft van het benodigde water van 65°C. Klop stevig met een garde. Voeg koud water (20°C) toe totdat de gewenste oplosverhouding is bereikt. De opgeloste melk is een dag houdbaar. Verstrek Topro Lammerenmelk via een lambar (voorraadvoeding, drinktemperatuur is staltemperatuur) of met een zuigfles (drinktemperatuur 40°C). Geef de eerste dag biest, daarna onbepert Topro Lammerenmelk.

Dag	Aantal voedingen	Hoeveelheid p. voeding
1e dag	.....6	60 ml biest
2e t/m 4e dag	.....4	125 ml lammerenmelk
5e t/m 7e dag	.....4	150 ml lammerenmelk
8e t/m 10e dag	.....4	200 ml lammerenmelk
11e t/m 15e dag	.....3	300 ml lammerenmelk
3e week	.....2	600 ml lammerenmelk
4e t/m 6e week	.....2	700 ml lammerenmelk
7e week	.....2	500 ml lammerenmelk
8e week	.....1	500 ml lammerenmelk

Schema is een richtlijn. Zorg bij verhoging van de melkgift voor geleidelijke overgangen. Na de eerste week goed hooi, lammerenkorrels en schoon water ter beschikking stellen.

#### Ten minste houdbaar tot

Zie verpakking.

#### Batchnummer

Zie verpakking.

#### Bewaaraadvis

Koel en droog bewaren.  
Na gebruik emmer goed afsluiten.

#### Erkenningsnr. producent

αNL09882  
GMP+ FSA geborgd  
PDV103322

Topro: registered trademark of

**Farmula**  
farming forward

**Formula B.V.**  
Sluiskolk 3-5  
7681 KC Vroomshoop NL  
info@topro.nl  
www.topro.nl

 **topro**  
animal health

